

U kunt uw zwangerschap ook bij SpringWorks Therapeutics melden via:

medinfo.DE@springworkstx.com

Naam patiënt:

Naam arts en contactgegevens:

5 maart 2026 CUP v1.0

PATIËNTENKAART voor Ogsiveo (nirogacestat)

Als nirogacestat tijdens een zwangerschap wordt ingenomen, kan het schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Ook kan het verlies van de zwangerschap tot gevolg hebben. Neem geen nirogacestat in als u zwanger bent. Als u zwanger kunt worden, zal uw arts controleren of u zwanger bent voordat u start met de behandeling met nirogacestat. Tijdens uw behandeling krijgt u ook zwangerschapstests als uw menstruatie is gestopt of anders dan anders is.

Bent u een vrouw die zwanger kan worden?
Of bent u een man met een partner die zwanger kan worden? Gebruik tijdens de behandeling met nirogacestat en nog 1 week na de laatste dosis:

- minstens één heel betrouwbaar voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een spiraaltje) of
- twee aanvullende voorbehoedsmiddelen, waaronder een barrièremethode (bijvoorbeeld condooms in combinatie met een zaaddodend middel).

Overleg met uw zorgverlener over de voorbehoedsmiddelen die voor u geschikt kunnen zijn. Uw arts zal u advies geven over goede voorbehoedsmiddelen.

Als u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn, vertel dit dan meteen aan uw arts. Als u zwanger bent, moet u stoppen met nirogacestat.

Draag deze patiëntenkaart altijd bij u.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.